

## Instructions for use

### Product Descriptor

Tooth Whitening Gel

**Description**  
 Simplee Brighter whitening is a dentist-controlled, dentist supervised, take-home whitening system, dispensed in syringes. The products are clear, high viscosity, sticky gels, containing carbamide peroxide along with potassium nitrate. The gels are available in carbamide peroxide concentrations of 10% and 16% (3.6% and 5.8% hydrogen peroxide equivalent).

**Precautions for Europe**  
 1. Not to be used on a person under 18 years of age.  
 2. To be only sold to dental practitioners. For each cycle of use, the first use to be only done by dental practitioners or under their direct supervision if an equivalent level of safety is ensured. Afterwards to be provided to the consumer to complete the cycle of use.  
 3. Please note the expiration date printed on the outer package/syringe.

### Precautions

- If you have any questions regarding the appropriate use of this product, including how long it will take to whiten your teeth, please consult your dentist.
- Regular dental checkups and cleanings are important before and after whitening to maintain a healthy smile.
- Some patients experience sensitivity with whitening. Should this occur, stop treatment, and contact your dentist.
- Some patients have noticed temporary discomfort of the gums, lips, throat, or tongue. Should any of these symptoms persist more than two days or progressively worsen, call your dentist. These side effects will usually subside within 1-3 days after treatment is discontinued.
- Pregnant or breastfeeding women, or patients with serious health concerns should not whitening. Consult their primary care provider prior to treatment.
- If patient has a known allergy or chemical sensitivity to any of the ingredients in Simplee Brighter whitening, do not use. Mint flavor can be irritating to some patients.
- Do not use household bleach to whiten teeth.
- Do not use tobacco or eat while whitening trays are in place.
- Teeth are naturally darker along the gum line. These areas may require more time to lighten than the rest of the tooth surface and usually remain slightly darker.
- White spots on the enamel during the whitening process may blend with continued whitening.
- Crowns, bridges, partial dentures, veneers, and composite fillings will not whiten.
- Coffee, tobacco, and other products can re-stain your teeth over time. Should this occur, teeth can be re-whitened.
- Some amalgam fillings may leave a dark purple color in your whitening tray; this is normal.
- Check expiration date and store according to instructions.
- Avoid swallowing large amounts of gel or water used to rinse gel residue from the teeth.
- Avoid contact with eyes. Rinse immediately if product comes into contact with them.

## Gebrauchsanweisung

### Produktbeschreibung

Zahnauflhellungsgel

**Beschreibung**  
 Das Simplee Brighter Zahnaufhellungssystem ist vom Zahnarzt verabreicht und vom Zahnarzt überwachtes Aufhellungssystem zur Anwendung zu Hause, das aus der Injektionspritze dispensiert wird. Die Produkte bestehen aus klaren, aromatisierten, hochviskosen, haftenden Gelen, die Carbamidperoxid zusammen mit Kaliumnitrat enthalten. Diese Gelen sind in Carbamidperoxid-Konzentrationen von 10 % und 16 % (gleichwertig zu 3,6 % und 5,8 % Wasserstoffperoxid) verfügbar.

### Precautions for Europe

1. Nicht bei Personen unter 18 Jahren anwenden.

2. Nur zum Verkauf an niedergelassene Zahnärzte. Bei jeder Anwendungszyklus darf die erste Anwendung nur durch niedergelassene Zahnärzte oder unter deren direkter Aufsicht vorgenommen werden, wenn ein vergleichbares Sicherheitsniveau gewährleistet ist. Danach wird es dem Verbraucher zur Verfügung gestellt, um den Anwendungszyklus zu vervollständigen.

3. Bitte beachten Sie das auf der Außenverpackung/Injektionsspritze aufgedruckte Verfallsdatum.

### Vorsichtsmaßnahmen

- Wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt bei Fragen bezüglich der richtigen Benutzung dieses Produkts, unter anderem mit der Frage, wie lange das Aufhellen der Zähne dauert.
- Regelmäßige Kontrollen und Reinigung durch den Zahnarzt sind vor und nach jeder Zahnaufhellung wichtig, um sich ein gesundes Lächeln zu bewahren.
- Einige Patienten erleiden durch die Zahnaufhellung eine Sensibilisierung. Sollte dies der Fall sein, müssen Sie die Behandlung abbrechen und sich an Ihren Zahnarzt wenden.
- Einige Patienten verspüren vorübergehende Beschwerden an Zahnfleisch, Lippen, Rachenraum oder Zunge. Sollten diese Symptome länger als zwei Tage anhalten oder sich zunehmend verschlimmern, wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt. Diese Nebenwirkungen werden normalerweise innerhalb von 1-3 Tagen nach dem Abbruch der Behandlung abklingen.
- Schwangere oder stillende Frauen oder Patienten mit schwerwiegenden Gesundheitsbedenken sollten sich keiner Zahnaufhellung unterziehen. Konsultieren Sie vor der Behandlung Ihren Hausarzt.
- Nicht verwenden, wenn bei Patienten eine bekannte Allergie oder eine chemische Sensibilisierung gegen Inhaltsstoffe der Simplee Brighter Zahnaufhellung vorliegt. Der Minzgeschmack kann für manche Patienten unangenehm sein.
- Zum Aufhellen der Zähne keine Haushaltsbleichmittel verwenden.
- Keinen Tabak und keine Speisen konsumieren, wenn Aufhellungsschalen eingesetzt sind.
- Zähne sind entlang des Zahnhalschards natürlich dunkler. Diese Stellen erfordern möglicherweise mehr Zeit für die Aufhellung als die restlichen Zahnoberflächen und bleiben in der Regel etwas dunkler.
- Weisse Flecken auf dem Zahnschmelz während des Aufhellungsprozesses können mit fortschreitender Aufhellung verschwinden.
- Kronen, Brücken, Teilprothesen, Verblendungen, und Komposit Füllungen lassen sich nicht aufhellen.
- White spots on the enamel during the whitening process may blend with continued whitening.
- Crowns, bridges, partial dentures, veneers, and composite fillings will not whiten.
- Coffee, tobacco, and other products can re-stain your teeth over time. Should this occur, teeth can be re-whitened.
- Some amalgam fillings may leave a dark purple color in your whitening tray; this is normal.
- Check expiration date and store according to instructions.
- Avoid swallowing large amounts of gel or water used to rinse gel residue from the teeth.
- Avoid contact with eyes. Rinse immediately if product comes into contact with them.

### Mode d'emploi

#### Descripteur du produit

Gel sbiancante dei denti

**Description**  
 Simplee Brighter est un système de blanchiment utilisable à domicile contrôlé et supervisé par le dentiste, à emporter chez soi, distribué dans des seringues. Les produits sont des gels transparents, adhésifs et à forte viscosité, contenant du peroxyde de carbamide et du nitrate de potassium. Les gels sont disponibles en concentrations de peroxyde de carbamide de 10 % et 16 % (3,6 % et 5,8 % d'équivalent peroxyde d'hydrogène).

**Measures de précaution pour l'Europe**  
 1. Ne pas utiliser sur une personne de moins de 18 ans.

2. Ne doit être vendu qu'aux praticiens dentistes. Pour chaque cycle d'utilisation, la première utilisation doit être effectuée uniquement par des dentistes ou sous leur supervision directe si un niveau de sécurité équivalent est garanti. Ensuite, le produit doit être fourni au consommateur pour compléter le cycle d'utilisation.

3. Veuillez tenir compte de la date de péremption imprimée sur l'emballage extérieur/la seringue.

### Mesures de précaution

- Si vous avez des questions concernant l'utilisation appropriée de ce produit, y compris le temps nécessaire pour blanchir vos dents, veuillez consulter votre dentiste.
- Il est important d'effectuer des contrôles et des nettoyages dentaires réguliers avant et après le blanchiment pour conserver un sourire éclatant.
- Certains patients ressentent une sensibilité lors du blanchiment. Dans ce cas, arrêtez le traitement et contactez votre dentiste.
- Certains patients ont ressenti une gêne temporaire au niveau des gencives, des lèvres, de la gorge ou de la langue. Si l'un de ces symptômes persiste plus de deux jours ou s'aggrave progressivement, rivolgersi al dentista. Questi effetti collaterali generalmente migliorano entro 1-3 giorni dalla sospensione del trattamento.
- Le donne incinte o che allattano al seno, o i pazienti con gravi problemi di salute non devono essere sottoposti a trattamenti di sbiancamento. Consultate il proprio medico curante prima del trattamento.
- In caso il paziente presenta allergie o sensibilità chimica a uno qualsiasi degli ingredienti contenuti nel trattamento sbiancante Simplee Brighter non utilizzarlo. Il gusto mentale può essere irritante per alcuni pazienti.
- Non usare la candeggina domestica per sbiancare i denti.
- Non consumare tabacco o mangiare mentre si indossa la mascherina per il trattamento sbiancante.
- I denti sono naturalmente più scuri lungo il bordo gingivale. Queste aree possono richiedere più tempo per lo sbiancamento rispetto al resto della superficie dentale e di solito rimangono leggermente più scure.
- Le macchie bianche che compaiono sulla smalto durante il processo di sbiancamento possono attenuarsi con il proseguimento dello sbiancamento.
- Le couronnes, les ponts, les prothèses partielles, les facettes et les obturations en composito non blanchissent pas.
- Le café, le tabac et d'autres produits peuvent laisser une couleur viola scuro sulla mascherina per lo sbiancamento.
- Certaines obturations à l'amalgame peuvent laisser une couleur violet foncé dans votre gouttière de blanchiment ; ce phénomène est normal.
- Evitez la date de péremption et conservez le produit conformément aux instructions.
- Evitez d'avaler de grandes quantités de gel ou d'eau utilisée pour rincer les résidus de gel sur les dents.
- Évitez tout contact avec les yeux. Rincez immédiatement si le produit entre en contact avec eux.

### Istruzioni per l'uso

#### Descrizione del prodotto

Gel sbiancante dei denti

**Descripción**  
 Simplee Brighter è un sistema di sbiancamento utilizzabile a domicilio controllato e supervisionato da dentista ed erogato in siringhe. I prodotti sono gel trasparenti, ad alta viscosità e appiccicosi e contengono perossido di carbamide, nitrato di potassio e fluoruro di sodio. I gel sono disponibili in concentrazioni di perossido di carbamide del 10% e del 16% (3,6% e 5,8% di perossido di idrogeno equivalente).

### Precauzioni per l'Europa

- Da non utilizzare su persone di età inferiore ai 18 anni.
- Vendita consentita solo agli odontoiatri professionisti. Per ogni ciclo di utilizzo, il primo uso deve essere effettuato solo da dentista o sotto la loro diretta supervisione se è garantito

un livello di sicurezza equivalente. Il prodotto può essere successivamente fornito al cliente ai fini del completamento del ciclo d'uso.

3. Controllare la data di scadenza stampata sull'esterno della confezione/sulla siringa.

### Precauzioni

- In caso di dubbi riguardanti l'uso appropriato di questo prodotto, compreso il tempo necessario per sbiancare i denti, rivolgersi al proprio dentista.
- Per mantenere un sorriso sano, i controlli e le pulizie dentali regolari sono importanti prima e dopo lo sbiancamento.
- Alcuni pazienti avvertono sensibilità durante il trattamento sbiancante. In tal caso, interrompere il trattamento e rivolgersi al proprio dentista.
- Alcuni pazienti hanno riscontrato un fastidio temporaneo alle gengive, labbra, gola o lingua. Nel caso in cui uno qualsiasi di questi sintomi persistesse per più di due giorni o peggiorasse progressivamente, rivolgersi al dentista. Questi effetti collaterali generalmente migliorano entro 1-3 giorni dalla sospensione del trattamento.
- Nei casi in cui si presenti una sensibilità cronica o una reazione allergica nei confronti di uno qualsiasi degli ingredienti contenuti nel trattamento sbiancante Simplee Brighter non utilizzarlo. Il gusto mentale può essere irritante per alcuni pazienti.
- Non usare la candeggina domestica per sbiancare i denti.
- Non consumare tabacco o mangiare mentre si indossa la mascherina per il trattamento sbiancante.
- I denti sono naturalmente più scuri lungo il bordo gingivale. Queste aree possono richiedere più tempo per lo sbiancamento rispetto al resto della superficie dentale e di solito rimangono leggermente più scure.
- Le macchie bianche che compaiono sulla smalto durante il processo di sbiancamento possono attenuarsi con il proseguimento dello sbiancamento.
- Le corone, i ponti, i protesi parziali, le facette e le otturazioni in composito non subiscono sbiancamento.
- Caffè, tabacco e altri prodotti possono macchiare nuovamente i denti nel corso del tempo. In questo caso, è possibile ripetere il trattamento sbiancante.
- Alcune otturazioni in amalgama possono lasciare un colore viola scuro sulla mascherina per lo sbiancamento.
- Controllare la data di scadenza e conservare secondo le istruzioni.
- Evitare l'ingestione di grandi quantità di gel o d'acqua usata per risciacquare i residui di gel sui denti.
- Manche Amalgamfüllungen können eine dunkelviolette Farbe in Ihrer Aufhellungsschale hinterlassen. Das ist normal.
- Verfallsdatum überprüfen und vorschriftsmäßig aufbewahren.
- Das Verschlucken großer Mengen des Gels oder des Wassers, das zum Spülen der Gel-Überreste von den Zähnen verwendet wurde, ist zu vermeiden.
- Kontakt mit den Augen vermeiden. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit den Augen. Sollte das Produkt in die Augen gelangen, die Augen sofort mit reichlich Wasser ausspülen.

### Návod k použití

#### Popis výrobku

Gel na bělení zubů

#### Popis

Simplee Brighter je bělicí systém určený k aplikaci kontrolované stomatologem po domácí použití. Dodává se ve stříkačkách. Výrobek jsou čiré lepidlo gely s vysokou viskozitou obsahující karbamid peroxidem a kalium-nitratem. Gely sou k dispozici v 10% a 16% (3,6% a 5,8% hidrogén-peroxid koncentraciínak fórmou).

**Európai használati kapcsolatos figyelmezettségek**

1. 18 éven aluli személyeknél nem használható.
2. Az termék kizárolág fogorvos részére értekezhető. minden használati cikluson belül ellsz használók a termék kizárolág fogorvos által vagy - megfelelő biztonságú feltelek esetén - közvetlen felügyelete által használható. Ez követően a termék a felhasználóhoz igénytelenül használható.
3. A prohlédně na datumu výroby a skladu.

### Istruzioni per l'uso

#### Bezpečnostní opatření pro Evropské země

1. Není určeno osobám mladším 18 let.
2. Prodává se pouze stomatologům. Při každém cyklu použití musí být první nanesení provedeno zubním lekárem nebo pod jeho přímým dohledem – pokud je zajištěna bezpečnost na stejně úrovni. Následně se systém předvádět společně s dokončeným cyklem používání.
3. Prohlédněte si datum výroby společně s dokončeným cyklem.

### Bezpečnostní opatření

1. Ne pas utiliser sur une personne de moins de 18 ans.

• Sjukområdet dataztyke vid vhodnému použití romlit. Hjärtig fogorvost. Ezek a mellékhatások általban a kezelést abbahagyása után 1–3 napon belül megszűnnek.

• Várandon vagy szoptató nők, illetve súlyos egészségügyi problémakkal küzdő betegek nem használhatják a fogfehéritőt. A kezelés előtt konzultálniuk kell ellszödleges fogfehéritőt.

• Ne használjon Simplee Brighter fogfehéritőt, ha a beteg ismereti allergiás vagy érzékeny a termék valamely összetevőjére. A mentas iz irányító lehet egyetek számára.

• Kronikus, broar, delproteser, faner og fyllinger kommer ikke blekes.

• Kaffe, tobak och andra produkter kan, med tiden, missfärga tänderna på nytt. Skulle detta inträffa kan tänderna blekas igen.

• Vissa amalgamfyllningar kan lämna en mörkilla färg i din blekningsbricka – det här är normalt.

• Kontrollera utgångsdatum och förvara enligt instruktionerna.

• Undgå kontakt med øynene. Undgå øyekontakt. Skjell umiddelbart hvis produktet kommer i kontakt med dem.

• Vitsyder som uppstår på emaljen under blekningsprocessen kan tonas ut vid fortsatt blekning.

• Kronikus, broar, delproteser, faner og fyllinger kommer ikke blekes.

• Kaffe, tobak och andra produkter kan, med tiden, missfärga tänderna på nytt. Skulle detta inträffa kan tänderna blekas igen.

• Undgå kontakt med øynene. Undgå øyekontakt. Skjell umiddelbart hvis produktet kommer i kontakt med dem.

• Kronikus, broar, delproteser, faner og fyllinger kommer ikke blekes.

• Undgå kontakt med øynene. Undgå øyekontakt. Skjell umiddelbart hvis produktet kommer i kontakt med dem.

• Kronikus, broar, delproteser, faner og fyllinger kommer ikke blekes.

• Undgå kontakt med øynene. Undgå øyekontakt. Skjell umiddelbart hvis produktet kommer i kontakt med dem.

• Kronikus, broar, delproteser, faner og fyllinger kommer ikke blekes.

• Undgå kontakt med øynene. Undgå øyekontakt. Skjell umiddelbart hvis produktet kommer i kontakt med dem.

• Kronikus, broar, delproteser, faner og fyllinger kommer ikke blekes.

• Undgå kontakt med øynene. Undgå øyekontakt. Skjell umiddelbart hvis produktet kommer i kontakt med dem.

• Kronikus, broar, delproteser, faner og fyllinger kommer ikke blekes.

• Undgå kontakt med øynene. Undgå øyekontakt. Skjell umiddelbart hvis produktet kommer i kontakt med dem.

• Kronikus, broar, delproteser, faner og fyllinger kommer ikke blekes.

• Undgå kontakt med øynene. Undgå øyekontakt. Skjell umiddelbart hvis produktet kommer i kontakt med dem.

• Kronikus, broar, delproteser, faner og fyllinger kommer ikke blekes.

• Undgå kontakt med øynene. Undgå øyekontakt. Skjell umiddelbart hvis produktet kommer i kontakt med dem.

• Kronikus, broar, delproteser, faner og fyllinger kommer ikke blekes.

• Undgå kontakt med øynene. Undgå øyekontakt. Skjell umiddelbart hvis produktet kommer i kontakt med dem.

• Kronikus, broar, delproteser, faner og fyllinger kommer ikke blekes.

• Undgå kontakt med øynene. Undgå øyekontakt. Skjell umiddelbart hvis produktet kommer i kontakt med dem.

• Kronikus, broar, delproteser, faner og fyllinger kommer ikke blekes.

• Und

